

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 24/06/2014

Dénomination du médicament

HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose

Encadré

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours de traitement, consultez un médecin.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose ?
3. COMMENT UTILISER HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiques

HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé chez l'adulte et l'enfant à partir d'un an, en cas d'irritation ou de gêne oculaire d'origines diverses (effort visuel soutenu, bain de mer ou de piscine, fatigue oculaire, atmosphère enfumée, etc...).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne pas donner HOMEOPTIC, COLLYRE EN RECIPIENT UNIDOSE aux enfants de moins d'un an.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose:

A réserver aux affections mineures, si les symptômes augmentent ou persistent plus de deux jours, consulter un médecin.

Ne pas utiliser:

- lorsque l'irritation s'accompagne de pus (paupières collées le matin au réveil)
- en cas de douleur vive, de choc direct, de blessure.

Consulter alors rapidement un médecin

Le port de lentilles de contact est déconseillé pendant toute la durée du traitement.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

En l'absence de données expérimentales et cliniques et par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

- 1 à 2 gouttes dans chaque œil, 2 à 6 fois par jour.
- Cesser le traitement dès la disparition des symptômes.

1. Ouvrir le sachet Aluminium.



2. Détacher un flacon unidose de la barrette.



3. Ouvrir l'unidose en tournant l'embout.



4. Tirer la paupière inférieure vers le bas tout en regardant vers le haut et déposer une goutte de collyre entre la paupière et l'œil (dans le cul-de-sac conjonctival), en pressant légèrement l'unidose.



5. Fermer soigneusement le sachet contenant les autres unidoses en repliant le côté ouvert.

Afin d'instiller une solution toujours stérile, utiliser une nouvelle unidose lors de chaque application.

Si vous avez l'impression que l'effet de **HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose** est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Voie ophtalmique.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose que vous n'auriez dû:

Consultez votre médecin ou votre pharmacien

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation

A conserver à l'abri de la chaleur.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose ?

Les substances actives sont:

Euphrasia officinalis	3 DH 1,00%
Calendula officinalis	3 DH 0,25%
Magnesia carbonica	5 CH 0,25%

Pour une dose de 0,4 ml.

Les autres composants sont:

Chlorure de sodium, eau purifiée

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que HOMEOPTIC, collyre en récipient unidose et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de collyre en récipient unidose sans conservateurs. Sachet de 5 unidoses.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

BOIRON
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY

Exploitant

BOIRON
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY

Fabricant

BOIRON
ZAC DES FRENES
1 RUE EDOUARD BUFFARD
77144 MONTEVRAIN

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.