

# NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 10/05/2016

## Dénomination du médicament

**TOPISCAB 5 %, crème**  
**Perméthrine**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## Sommaire notice

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TOPISCAB 5 %, crème et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser TOPISCAB 5 %, crème ?
3. Comment utiliser TOPISCAB 5 %, crème ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TOPISCAB 5 %, crème ?
6. Informations supplémentaires.

### **1. QU'EST-CE QUE TOSPICAB 5 %, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

#### **Classe pharmacothérapeutique**

La substance active contenue dans TOPISCAB 5 %, crème est la perméthrine.  
La perméthrine appartient à la famille des pyréthrine qui agissent contre les parasites.

#### **Indications thérapeutiques**

TOPISCAB 5 %, crème est utilisé pour traiter la gale.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER TOSPICAB 5 %, crème ?**

#### **Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament**

Sans objet.

#### **Contre-indications**

**N'utilisez jamais TOPISCAB 5 %, crème :**

- si vous êtes allergique à la perméthrine, à d'autres pyréthrine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

## Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

### Mises en garde et précautions d'emploi

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser TOPISCAB 5 %, crème :

- pour traiter des nourrissons : voir ci-dessous dans la rubrique « Enfants jusqu'à 23 mois »
- si vous avez des allergies connues aux chrysanthèmes ou à d'autres astéracées, vous ne devez utiliser TOPISCAB 5 %, crème qu'après avoir consulté votre médecin.

### Avertissement :

Uniquement réservé à une application cutanée. Ce médicament ne doit pas être avalé.

Il faut éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses (lèvres, narines, zone génitale) ou les plaies ouvertes.

En cas de peau sèche, l'utilisation de crèmes hydratantes et des bains à base d'huiles est recommandé.

TOPISCAB 5 %, crème est nocif pour toutes les espèces d'insectes, ainsi que pour les organismes qui vivent dans l'eau (poissons, daphnies, algues). Il convient par conséquent de veiller à ce que TOPISCAB 5 %, crème ne contamine pas les aquariums et les terrariums.

TOPISCAB 5 %, crème contient des composants (la paraffine et la vaseline blanche) qui peuvent diminuer l'efficacité de produits contenant du latex (p. ex. préservatifs, diaphragmes) lors d'une utilisation simultanée.

### Enfants jusqu'à 23 mois

N'utilisez pas TOPISCAB 5 %, crème chez les nouveau-nés et les nourrissons au cours des 2 premiers mois de la vie, sauf si votre médecin vous l'a formellement prescrit. Les données chez les nourrissons âgés de 2 à 23 mois sont limitées. Aussi le traitement des enfants jusqu'à l'âge de 23 mois ne doit être instauré que sous surveillance médicale étroite.

## Interactions avec d'autres médicaments

### Autres médicaments et TOPISCAB 5 %, crème

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez/utilisez, avez récemment pris/utilisé ou pourriez prendre/utiliser tout autre médicament.

## Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

## Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

## Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Compte tenu des conditions d'utilisation (voie cutanée, 2 applications à une semaine d'intervalle), l'utilisation de TOPISCAB 5%, crème au cours de la grossesse peut être envisagée si nécessaire.

Par mesure de précaution, il convient d'arrêter l'allaitement durant le traitement par TOPISCAB 5%, crème.

## Sportifs

### Sportifs

Sans objet.

## Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

## Liste des excipients à effet notoire

TOPISCAB 5 %, crème contient de l'alcool cétostéarylique et de l'acide sorbique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma, dermatite de contact).

## 3. COMMENT UTILISER TOSPICAB 5 %, crème ?

### Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

### Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

#### Posologie

Le traitement consiste en deux applications cutanées : une 1<sup>ère</sup> application (jour zéro) suivie d'une 2<sup>ème</sup> application une semaine plus tard (jour huit). Dans tous les cas, la durée entre 2 applications ne doit pas être inférieure à 7 jours et pas supérieure à 14 jours.

#### Adultes et adolescents de plus de 12 ans :

Appliquer 30 g de crème (correspondant à un tube de 30 g).

#### Enfants de 6 à 12 ans :

Appliquer 15 g de crème (correspondant à ½ tube de 30 g).

#### Enfants de 1 à 5 ans :

Appliquer 7,5 g de crème (correspondant à une quantité de crème équivalente à la taille de deux noisettes).

#### Enfants de 2 mois à 1 an :

Appliquer 3,75 g de crème (correspondant à une quantité de crème équivalente à la taille d'une noisette).

Appliquer délicatement une fine couche de crème sur la peau (voir le paragraphe "Mode d'administration").

TOPISCAB 5 %, crème est uniquement réservé à une application cutanée.

Afin d'éviter tout risque de contamination entre individus lors de l'application, il est nécessaire d'utiliser 1 tube par patient.

Lors de l'application de TOPISCAB 5 %, crème, veillez à ce que la crème ne pénètre pas dans les yeux ou ne soit pas en contact avec les muqueuses (lèvres, bouche, narines, zone génitale) ou des plaies ouvertes. En cas de contact accidentel, rincez soigneusement la zone concernée avec de l'eau.

Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif. Les posologies peuvent être augmentées selon la corpulence du patient.

#### Mode d'administration

##### Adultes

Appliquez la crème en fine couche sur l'ensemble du corps, sans oublier le cou, la nuque, la paume des mains et la plante des pieds. Inutile d'appliquer la crème sur la tête et sur le visage, sauf si atteints par la gale.

Lors de l'application, accordez une attention toute particulière aux espaces entre les doigts des mains et des pieds (également aux zones situées sous les ongles des doigts et des orteils), aux poignets, aux coudes, aux aisselles, aux organes génitaux externes et aux fesses.

##### Enfants

Appliquez la crème en fine couche uniformément sur l'ensemble du corps, sans oublier la paume des mains et la plante des pieds, le cou, la nuque, le visage, les oreilles et le cuir chevelu.

Évitez d'appliquer TOPISCAB 5 %, crème sur les zones de peau qui entourent la bouche (la crème pourrait être léchée) et les yeux. Empêchez l'enfant de lécher la crème sur ses mains. Si nécessaire, les enfants devront porter des gants.

Les données relatives à l'utilisation de TOPISCAB 5 %, crème chez les nourrissons et les enfants en bas âge étant limitées, le traitement des enfants jusqu'à 23 mois ne doit être effectué que sous surveillance médicale étroite.

### Sujets âgés (de plus de 65 ans)

Appliquez la crème en fine couche sur les mêmes zones que l'adulte, mais en plus traitez le visage, les oreilles et le cuir chevelu en évitant les zones de peau situées à proximité des yeux.

### Durée du traitement

La crème doit agir sur la peau pendant au moins 8 heures, par exemple pendant la nuit. Pour garantir l'efficacité du traitement, il faut éviter de prendre des bains, de se doucher et de se laver pendant ce laps de temps. S'il arrive exceptionnellement que les mains soient lavées au cours de ces huit heures, il faut de nouveau appliquer de la crème sur les mains et les poignets. Si vous devez laver d'autres zones de peau traitées (fesses, organes génitaux externes), appliquer de nouveau de la crème sur ces zones. Au minimum 8 heures après l'application, il faut éliminer les restes de crème en se douchant ou en se lavant avec de l'eau et du savon.

### **Informations complémentaires**

Toutes les personnes avec qui vous avez été en contact, en particulier des membres de la famille et le/la partenaire, doivent consulter un médecin le plus tôt possible. Le médecin décidera si ces personnes doivent aussi être traitées.

Il est conseillé de :

- Avoir les ongles courts et bien propres.
- Le lendemain de l'application (à J1), vous devez changer de vêtements, de draps et de serviettes et les laver à au moins 60°C ce qui permet de décontaminer efficacement le linge.
- Désinfectez dans le même temps les vêtements et le linge de lit de toutes les personnes vivant sous le même toit, utilisés depuis moins de 72 heures en cas de gale commune.
- Dans le cas où le linge ne peut être lavé en machine à cette température, l'utilisation d'un acaricide permet de procéder à une désinfection du linge dans un délai relativement court. Le linge peut également être laissé dans un sac pendant au moins 72 heures à température intérieure (> 20°C).
- Passer l'aspirateur énergiquement sur les tapis et les coussins.

### **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

#### **Si vous avez utilisé plus de TOPISCAB 5 %, crème que vous n'auriez dû**

En cas d'utilisation externe, aucun surdosage n'est à craindre.

En cas d'ingestion accidentelle ou volontaire, il faut immédiatement consulter un médecin.

### **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

#### **Si vous oubliez d'utiliser TOPISCAB 5 %, crème:**

Appliquez la crème le plus tôt possible.

### **Risque de syndrome de sevrage**

#### **Si vous arrêtez d'utiliser TOPISCAB 5 %, crème:**

Vous diminuez les chances de succès de votre traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Consulter immédiatement un médecin en cas de réactions graves d'hypersensibilité. Dans ce cas, vous ne devez plus utiliser TOPISCAB 5 %, crème.

Fréquents (pouvant affecter 1 à 10 patients traités)

Démangeaisons (prurit), rougeurs de la peau ou sensations anormales sur la peau (paresthésies) tels que picotements, fourmillements, sensations de brûlure, ainsi que sécheresse de la peau, sont fréquents. Mais de tels symptômes peuvent aussi faire partie de l'évolution naturelle de la maladie. Des démangeaisons et une éruption cutanée (eczéma post-scabieux) peuvent persister jusqu'à quatre semaines après la fin du traitement, ce qui est généralement considéré comme une réaction aux parasites morts. Si après avoir appliqué TOPISCAB 5 %, crème, vous avez l'impression que la maladie persiste, veuillez consulter votre médecin avant de renouveler l'application.

Rares (pouvant affecter 1 à 1 000 patients traités)

Des céphalées peuvent survenir dans de rares cas.

Très rares (pouvant affecter 1 à 10 000 patients traités)

Dans de très rares cas, l'application de TOPISCAB 5 % a été associée à des excoriations superficielles, à une inflammation des follicules du cuir chevelu (folliculite), ainsi qu'à une hypopigmentation de la peau.

Des problèmes respiratoires ont également été rapportés chez des personnes allergiques lors de l'utilisation de substances du groupe des pyréthrinés.

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Des réactions d'intolérance peuvent apparaître sur la peau (réactions allergiques de contact). Elles peuvent se manifester sous forme de démangeaisons, rougeurs, vésicules ou urticaire.

Des nausées peuvent survenir. À ce jour, aucun vomissement n'a été rapporté après utilisation de TOPISCAB 5 %, crème mais après utilisation d'autres médicaments contenant la même substance active (perméthrine).

## **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. - Site internet: [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER TOSPICAB 5 %, crème ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

### **Date de péremption**

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le tube et l'étui après « EXP : ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

### **Conditions de conservation**

Conserver le tube soigneusement fermé.

Après première ouverture du tube : le médicament doit être conservé maximum 12 semaines.

### **Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

TOPISCAB 5 %, crème est nocif pour tous types d'insectes et aussi pour les animaux vivants dans l'eau comme les poissons.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

### **Liste complète des substances actives et des excipients**

**Ce que contient TOPISCAB 5 %, crème**

· La substance active est la perméthrine.

100 g de crème contient 5 g de perméthrine

· Les autres composants sont : alcool céstéarylique émulsifiant (type A), paraffine liquide, vaseline blanche, acide sorbique et eau purifiée

## Forme pharmaceutique et contenu

### Aspect de TOPISCAB 5 % crème et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de crème blanche de consistance molle.

Ce médicament est disponible en tube de 30 g et 5 x 30 g.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

## Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

### Titulaire

#### Codexial Dermatologie

10 rue du Bois de la Champelle  
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

### Exploitant

#### Codexial Dermatologie

10 rue du Bois de la Champelle  
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

### Fabricant

#### INFECTIOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH

VON-HUMBOLDT-STRASSE 1  
64646 HEPPENHEIM  
ALLEMAGNE

## Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

## Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est < {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

## AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

## Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

## Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

## Autres

Sans objet.